

Prova 2 de Cálculo 1 (MTM3110)
RESPOSTAS VERSÃO B

- 1) Usando a função $f(x) = x^3$ e $x_0 = 2$, a aproximação obtida para $(1,998)^3$ usando diferenciais é igual a

(A) $8 + \frac{3}{250}$. (B) $8 + \frac{3}{125}$. (C) $8 - \frac{3}{250}$. (D) $8 - \frac{3}{125}$. (E) 7,998. (F) outro valor.

Respostas corretas: (D)

- 2) Duas grandezas físicas u e v variam com o tempo (representado pela letra t) e estão relacionadas pela igualdade $uv = v^2 + 2$. Sabendo que $\frac{dv}{dt} = 5$, o valor de $\frac{du}{dt}$ quando $v = 2$ é igual a

(A) $-\frac{5}{2}$. (B) $\frac{5}{2}$. (C) $\frac{5}{3}$. (D) 1. (E) $-\frac{5}{3}$. (F) outro valor.

Respostas corretas: (B)

- 3) Uma caixa em formato de paralelepípedo, sem tampa e com volume igual a 200 cm^3 será produzida. O comprimento de sua base é o dobro da largura. O material para a construção da base custa R\$ 6,00 por centímetro quadrado e o material para a construção das faces laterais custa R\$ 5,00 por centímetro quadrado. Se a , b e c são as medidas do comprimento, largura e altura que minimizam o custo de produção da caixa, então $a + b + c$ é igual a

(A) 19 cm. (B) 14 cm. (C) 36 cm. (D) 17 cm. (E) 12 cm. (F) outro valor.

Respostas corretas: (A)

4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + x - \sin x}{1 - \cos x} =$

(A) 1. (B) $+\infty$. (C) 6. (D) 3. (E) 0. (F) outro valor.


Respostas corretas: (C)

- 5) O(s) intervalo(s) no(s) qual(is) a função $f(x) = \frac{x^2 + 4}{x^2 + 2x + 7}$ é crescente é(são)

(A) $(-\infty, -2]$ e $[2, \infty)$. (B) $(-\infty, -4]$ e $[1, \infty)$. (C) $(-\infty, \infty)$.
(D) $[-4, 1]$. (E) $[-2, 2]$. (F) outro valor.

Respostas corretas: (B)

6) Assinale a alternativa que melhor representa o gráfico da função $f(x) = \frac{1}{4}(-x^3 + 12x + 20)$.




Respostas corretas: (F)

7)

Na figura ao lado, estão representados os gráficos das funções f e g e, nas regiões em que há um número, este número representa a área da região.

$$\int_a^d [f(x) - 2g(x)] dx$$

é igual a



- (A) -17. (B) -27. (C) -5. (D) -9. (E) -13. (F) outro valor.

Respostas corretas: (A)

8) O ponto de máximo absoluto de $f(x) = (1-x)\sqrt{x-x^2}$ é

- (A) $x = \frac{1}{2}$. (B) $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $x = \frac{3}{4}$. (D) $x = 0$. (E) $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. (F) outro valor.

Respostas corretas: (F)

9) $\int_1^2 \left(2x - \frac{2}{x^3} + 3\sqrt{x} \right) dx =$

- (A) $\frac{3+12\sqrt{2}}{4}$. (B) $\frac{7+\sqrt{2}}{4}$. (C) $\frac{1+16\sqrt{2}}{4}$. (D) $\frac{7+16\sqrt{2}}{4}$. (E) $\frac{6\sqrt{2}-57}{8}$. (F) outro valor.

Respostas corretas: (C)

10) Sobre a função $f(x) = (3x + 1)e^{-2x}$, é possível afirmar que

- (A) $-\frac{1}{2}$ e $-\frac{1}{3}$ são seus dois pontos de inflexão. (B) não possui pontos de inflexão.
(C) $\frac{1}{6}$ é seu único ponto de inflexão. (D) $\frac{2}{3}$ é seu único ponto de inflexão.
(E) 0 e $-\frac{1}{3}$ são seus dois pontos de inflexão. (F) nenhuma das alternativas anteriores.
-

Respostas corretas: (D)

11) Encontre a primitiva $F(x)$ de $f(x) = x^2 - 4x + 7 + 3 \sin x$ que satisfaz $F(0) = 15$.

12) Calcule a integral $\int \left(3 - \sec^2 x + \frac{x^3}{x^4 - 5} \right) dx$.